

## KORT



### PSYCHOTESTEN BIJ ADHD ONNODIG

Voor de classificatie van adhd is psychodiagnostisch onderzoek (po) niet nodig. Sterker: het testinstrumentarium dat hiervoor wordt gebruikt, geeft geen uitsluitsel over adhd. Toch wordt in de jeugd-ggz vaak standaard zo'n po uitgevoerd. Dat is inefficiënt en belastend voor de cliënt.

NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK IS ONNODIG OM ADHD TE CLASSIFICEREN! Y.KALDENBACH, KIND EN ADOLESCENT PRAKTIJK, APRIL 2010 (1)

### DENKPROBLEMEN BIJ SCHIZOFRENIEPATIËNTEN

Problemen met informatieverwerking bij patiënten met schizofrenie komen voort uit een subtiele afwijking in een deel van de hersenen. Hierdoor wordt fragmentarisch gebruik gemaakt van de context van gebeurtenissen en snapt de patiënt het verband tussen de onderscheidende details niet.

REDUCED CONTEXT EFFECTS ON RETRIEVAL IN FIRST-EPIISODE SCHIZOPHRENIA. LUCIA M.TALAMINI E.A., PLUS ONE, WWW.PLUSONE.ORG

### PSYCHOTISCHE SYMPTOMEN TWAALFJARIGEN

Zelfrapportage van hallucinaties en wanen door twaalfjarigen uit de algemene bevolking werkt goed en is een manier om de bekende risicofactoren van schizofrenie reeds op deze leeftijd te detecteren. De symptomen bij de twaalfjarigen hangen samen met andere psychiatrische klachten en met een ongunstige thuissituatie.

ETIOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF CHILDHOOD PSYCHOTIC SYMPTOMS. G. POLANCZYK E.A., ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY, 67, APRIL 2010



### NIEUW ONDERZOEK



### MEER ZON, MINDER DEPRESSIE?

Is gebrek aan vitamine D een mogelijke oorzaak van depressie of angst, of juist een gevolg? VU Medisch Centrum gaat onder leiding van psychiater Witte Hoogendijk drieëndertig jongvolwassenen met depressie of angst onderzoeken op hun vitamine D-spiegel. Er is een even grote gezonde controlegroep. Gebrek aan vitamine D ontstaat meestal door te weinig zonlicht. Uit eerder onderzoek onder ouderen tussen de 65 en 95 jaar was al gebleken dat hoe lager de vitamine D-spiegel hoe ernstiger de depressie. Het onderzoek onder de jongeren gaat twee jaar duren. (ML)

### TIJDSCHRIFT

## INNERLIJKE COLLABORATIE

Veel patiënten in de ggz hebben als kind een trauma opgelopen door mishandeling, seksueel misbruik, pesten, oorlog of ander geweld. Vreemd genoeg is er pas de laatste tijd brede aandacht voor deze 'vroegkinderlijke traumatisering' en ontstaan er in het land gespecialiseerde behandelcentra. Het laatste nummer van *Cogiscope*, tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, uitgegeven door kenniscentrum Cogis, heeft als thema *Als kind getraumatiseerd*. Een artikel van Wietse Tol, werkzaam bij HealthNet TPO, laat zien hoe de kinderen in oorlogssituaties het best ondersteund kunnen worden. Psychiater Nelleke Nicolai toont de valkuilen die je als therapeut moet omzeilen als je een cliënt behandelt die in zijn of haar jeugd ernstig is getraumatiseerd. De Duitse huisarts/psychotherapeut Hedwig Sombroek schrijft over 'innerlijke collaboratie', de specifieke dynamiek die ontstaat tussen dader en slachtoffer, en het gebruik van verbeelding en symbolen om af te rekenen met beschadigde 'kinddelen'. Nel Draijer en Willie Langeveld gaan in op de diagnostiek van vroegkinderlijke traumatisering. (ML)

COGISCOPE, TIJDSCHRIFT OVER GEVOLGEN VAN OORLOG EN GEWELD, NUMMER 04/09. TE BESTELLEN VIA REDACTIE@COGIS.NL OF VIA WWW.COGIS.NL. € 8,-.

# 5

*procent van de Nederlanders heeft in zijn leven last van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Het gaat om meer dan twee keer zoveel mannen als vrouwen. Onder jonge mannen tussen 18 en 24 jaar is de antisociale persoonlijkheidsstoornis het meest verbreid. Ruim dertien procent kampt er dan mee.*

DEZE CIJFERS KOMEN UIT DE TWEEDE NEMESIS BEVOLKINGSSTUDIE.